

第7講 符号検定

田中重人 (東北大学文学部准教授)

[テーマ] 対応のある項目間の比較

1 進捗確認課題結果

20点満点 (6 + 7 + 7)

2 変数間の関連と比較

- 類似性・因果関係 相関係数行列
- どの変数がより高い/低い? 変数間の比較 (対応のある分析、被験者内要因)
 - 例: 10歳から20歳間の身長の変化
 - 例: 授業の前後での知識の変化
 - 例: 「見れる」と「起きれる」ではどちらのほうが受容度が高いか?
 - 例: 問27の8項目のうち、最も「重要」と評価されているもの/されていないものはどれか?

とりあえず、平均値を並べて比較するには:

SPSSでは「分析」「記述統計」「記述統計」で多くの変数の平均値(と標準偏差)を並べて出力できる。

3 「対応」とは

同一ケースが複数の項目に回答している場合、項目間に「対応」があるという。

このような項目の比較には、対応を考慮した分析法を使う必要がある。

例題: つぎのような3ケース×2変数のデータについて、どちらの変数が大きくなる傾向にあるかを考えてみよう:

	変数 A		変数 B	差
ケース X	4	-	5	=
ケース Y	3	-	4	=
ケース Z	5	-	1	=

平均値

多数決をとると?

このように、ケース間の異質性が大きい場合は、対応を考慮して分析しないと、データの特徴をつかみそこねる可能性がある。

4 ふたつの変数での大小の比較

4.1 例題

「B. 高い収入」 vs. 「D. 家族からの信頼・尊敬」 どちらが大切?

B>D の人と B<D の人のどちらが多いか?

これら 2 つ以外に B=D の人がいるから、これをどうあつかうかが問題になる。

4.2 符号検定

「符号検定」(sign test) とは...

1. $A = B$ のケースを除外
2. 帰無仮説: 「母集団では同数」 (=50%)
3. 正規分布を利用して検定をおこなう

この考えかたは、比率の区間推定とおなじものなので、比率 \pm 臨界値 \times 標準誤差 で信頼区間を求めていると考えてもよい

4.3 SPSS コマンド

- 「ノンパラメトリック検定」 「過去のダイアログ」 「2個の対応サンプルの検定」
- 比較したい変数をペアで指定する
- 「符号検定」をチェック

5 課題

適当な 2 変数について、符号検定を行う。クロス表 (または相関図) も出力して、結果を解釈すること。ISTU で来週月曜正午まで。

参考 URL

<http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/sign-test.html> 青木繁伸：符号検定の簡潔な説明

<http://kusuri-jouhou.com/statistics/fugou.html> 役に立つ薬の情報～専門薬学: 架空データによる符号検定の説明：小標本 / 大標本